

**1. Welche Unterschiede gibt es zwischen einem Mann mit Spina bifida und einem Nicht – Gelähmten?**

Relativ häufig findet ein Urologe bei Jungs einen Hodenfehlstand, d.h. die Hoden sind nicht oder nicht immer an Ort und Stelle.

Die Behandlung eines Hodenfehlstandes sollte bis zum Ende des zweiten Lebensjahres erfolgen.

Junge Männer mit angeborener Querschnittlähmung klagen häufig über eine zu geringe oder zu kurz dauernde Gliedversteifung, fehlenden oder vorschnellen Samenerguss.

**2. Kann man als Mann mit Spina bifida Vater werden?**

Ja. Allerdings sind die Chancen nicht ganz so gut, wie bei einem Nicht – Gelähmten.

Aus bisher unbekanntem Gründen ist die Qualität des Samens nicht ganz so gut wie bei Nicht – Gelähmten.

Oft besteht das Problem, dass ohne Hilfsmittel kein Samenerguss möglich ist.

**3. Was ist „künstliche Befruchtung“?**

Wenn ein Mann mit einer Querschnittlähmung keinen

Samenerguss hat, kann man den Samen direkt aus dem Hoden entnehmen und mit der Eizelle zusammen bringen. Dieses wird der Frau dann wieder in die Gebärmutter eingesetzt.

**4. Kann man den Samenerguss künstlich hervorrufen?**

Ja, dafür gibt es eine Menge verschiedener Methoden. Bei fast allen Männern mit Querschnittlähmung kann man mit einem Vibrator einen Samenerguss erzeugen. Bei Kinderwunsch kann ein Vibrator verordnet werden und dann zu Hause benutzt werden, um Samen zu gewinnen.

Wenn das nicht gelingt, kann mit einer spezifischen Reizung mit elektrischem Strom Erfolg haben.

Daneben gibt es noch die Möglichkeiten, Medikamente einzusetzen.

**5. Kann man als Mann Empfängnisverhütung betreiben?**

Bisher nur mit einem Kondom. Die „Pille für den Mann“ wird aber demnächst erhältlich sein.

**6. Was kann man gegen eine unzureichende Gliedversteifung machen?**

Eine Menge. Mittlerweile gibt es viele Möglichkeiten, einem Mann dabei zu helfen. Seit kurzem ist ein Medikament erhältlich, das auch bei Männern zuverlässig hilft.

In hartnäckigen Fällen kann Alprostadil direkt in den Schwelkörper injiziert werden oder in die Harnröhre eingeführt werden. Damit ist immer eine Erektion zu erreichen.

**7. Was kann man gegen vorzeitigen Samenerguss tun?**

Man kann eine Creme benutzen, die die Empfindlichkeit der Eichel herabsetzt. Wird diese Creme eine Stunde vorher aufgetragen, hat sie eine zuverlässige Wirkung.

**8. Kann „Mann“ einen Orgasmus ohne Samenerguss haben?**

Ja, das kann geschehen. Manchmal findet der Samenerguss rückwärts in die Harnblase statt oder fehlt ganz.




**Impressum:**

verfasst in Text von Hr. Dr. Richter,  
nach einer Idee von G. Franke,  
ASbH Brandenburg  
Layout: Tina Mäueler, ASbH  
Brandenburg

**Kontaktadresse:**

ASbH Landesverband Brandenburg  
Ricarda Huch Str. 2  
14480 Potsdam  
Tel. 0331/6261771  
Fax. 0331/60060000  
Email [info@asbh-potsdam.de](mailto:info@asbh-potsdam.de)



Fragen und Antworten zur Sexualität  
bei

Jungen / Männern mit Spina bifida